



Bayfolan® Sólido

Fertilizante Inorgánico foliar / Sólido

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

N, P, K + Microelementos

Composición porcentual:

% en peso/peso		% en peso/peso	
Nitrógeno total (N).....	24.00%	Calcio (Ca).....	0.020%
Fósforo como (P ₂ O ₅).....	17.00%	Magnesio (Mg).....	0.025%
Potasio como (K ₂ O).....	13.00%	Cobre (Cu).....	0.025%
Azufre (S).....	0.20%	Cobalto (Co).....	0.005%
Hierro (Fe).....	0.10%	Molibdeno (Mo).....	0.0025%
Zinc (Zn).....	0.10%	Clorhidrato de tiamina.....	0.0040%
Manganeso (Mn).....	0.05%	Acido indol acético.....	0.0030%
Boro (B).....	0.04%		

No. de Registro:

RSCO-0353/II/99

Descripción:

Bayfolan® Sólido es una fórmula especial concentrada de nutrimentos que contiene vitaminas y fitohormonas; actúa estimulando los procesos metabólicos de las plantas vigorizándolas al proporcionarles los nutrimentos indispensables para su buen desarrollo. La planta los aprovecha íntegramente y su efecto se manifiesta en cultivos vigorosos y cosechas más abundantes y de calidad.

Bayfolan® Sólido ayuda a resolver deficiencias de microelementos, frecuentes en zonas con aguas duras. Para optimizar los resultados del producto, aplíquelo cuando los cultivos están en etapas de desarrollo vegetativo o producción intensiva.

USOS

Cultivos	Dosis*	Observaciones
Aguacatero Cacao Cafeto Cítricos Duraznero Manzano Papayo Guayabo Mango Nogal Vid Banano	0.5 - 1.0 Kg / 100 L de agua 1.0 Kg / 200 L de agua 1.0 Kg / 250 L de agua	Si el gasto de la aspersora es menor a 500 L de agua. Si la aspersora gasta entre 600 y 1500 L de agua. Si la aspersora gasta más de 1500 L de agua. Iniciar las aplicaciones cuando empiece la brotación de yemas. Tratamientos adicionales, se hacen poco antes de la floración, de la fructificación y cuando los frutos empiezan a madurar. Realizar aplicaciones en post-cosecha.



Ficha técnica – Productos Fitosanitarios

Viveros	50 g / 10 L de agua	Las plantas en viveros, semilleros y almácigos pueden tratarse con Bayfolan® Sólido . Repetir el tratamiento de 15 a 20 días según sea necesario.
Algodonero	1.0 - 2.0 Kg/ha	Se deben de iniciar las aplicaciones de Bayfolan® Sólido cuando las plantitas tengan de 10 a 15 cm de altura. Cuando la planta ya está establecida y tenga una altura mayor, repetir las aplicaciones con estas dosis cada 3 a 4 semanas.
Alfalfa	1.0 – 2.0 Kg/ha	La aplicación debe realizarse a los 10 días posteriores a cada corte.
Trigo Cebada Avena	1.0 – 2.0 Kg/ha	Hacer la primera aplicación cuando las plantas han formado 4 – 5 hojas. Repetir al embuche.
Chile Melón Pepino Sandía Jitomate Coles	2.0 – 4.0 Kg/ha	Se debe comenzar con la dosis baja de 2 a 5 días después del transplante. Después aplicar 1 a 2 aspersiones durante el desarrollo vegetativo a un intervalo de 15 días y luego durante la floración para promover el amarre de frutos.
Maíz Sorgo Papa Soya	2.0 – 4.0 Kg/ha	Realizar 3 aplicaciones a intervalos semanales durante el desarrollo vegetativo.
Plantas Ornamentales	10 g / L de agua	Repetir la aplicación cada 3 a 4 semanas según sea necesario. Realizar las aplicaciones en las horas frescas del día.

***La variación de la dosis dependerá del desarrollo vegetativo de los cultivos.**

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Kg