

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS					
TIPO DE AGROINSUMO: Insecticida y/o acaricida agrícola					
NOMBRE COMERCIAL: MONITOR® 600					
FORMULACION: Líquido soluble		pH DE LA FORMULACIÓN: No Disponible		COLOR: Amarillo pálido	SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: % EN PESO			PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: Metamidofos		FAMILIA QUIMICA: Organofosfatos FORMULA QUIMICA: C ₂ H ₈ NO ₂ PS
Ingrediente activo Metamidofos (R S) – (0, S-dimetil fosoramidotioato)48.0 (Equivalente a 600 g de i.a./L a 20° C)					
Ingredientes inertes Disolventes y compuestos Relacionados 52.0 Total: 100.0					
MODO DE ACCION: MONITOR® 600 es un insecticida / acaricida organofosforado sistémico de amplio espectro que actúa sobre insectos chupadores y masticadores. MONITOR® 600 actúa inhibiendo la colinesterasa y afectando el sistema nervioso central.					
CATEGORÍA DE PELIGRO: 1 Peligro		RESIDUALIDAD: Altamente		NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-INAC-0144-377-052-048	
USOS AUTORIZADOS:					
CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS Litros/ha	RECOMENDACIONES	
Algodonero (35)	Trips (<i>Frankliniella</i> spp), Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>)		0.75 a 1.0	Inicie las aplicaciones cuando las larvas se encuentran en estado L1 o L2 y la dosis más alta cuando estén en estado L3 o L4 o cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
	Chinche rápida (<i>Creontiades</i> spp), Pulga saltona negra (<i>Spanagonychus albofasciatus</i>), Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Chinche apestosa café (<i>Euschistus servus</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano medidor (<i>Alabama argillacea</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>)		1.0 a 1.5		
	Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp)		1.0 a 2.0		
	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp)		1.0		
Berenjena (14)	Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>)		1.0 a 1.5	Inicie las aplicaciones cuando las larvas se encuentran en estado L1 o L2 y la dosis más alta cuando estén en estado L3 o L4 o cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
Brócoli (14)	Chinche arlequín (<i>Murgantia histrionica</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano del corazón de la col (<i>Copitarsia consuetata</i>), Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)		1.0	Inicie las aplicaciones cuando las larvas se encuentran en estado L1 o L2 y la dosis más alta cuando estén en estado L3 o L4 o cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
	Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Mariposita blanca (<i>Artogeia rapae</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Pulga saltona (<i>Phyllotreta</i> spp)		1.0 a 1.5		
Col (35) Col de Bruselas (21) Coliflor (28)	Gusano del corazón de la col (<i>Copitarsia consuetata</i>), Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>), Chinche arlequín (<i>Murgantia histrionica</i>)		1.0	Inicie las aplicaciones cuando las larvas se encuentran en estado L1 o L2 y la dosis más alta cuando estén en estado L3 o L4 o cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalo de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada	
	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Mariposita blanca (<i>Artogeia rapae</i>)		1.0 a 1.5		
Chile (21)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>), Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		1.0	Inicie las aplicaciones cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)		1.0 a 1.5		
Lechuga (21)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)		1.0	Inicie las aplicaciones cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
	Pulgón (<i>Aphis</i> spp)		0.75 a 1.0		
Jitomate (21)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>), Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano Falso Medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)		1.0	Aplique en etapas iniciales del cultivo, inicie aplicaciones cuando las larvas se encuentran en estado L1 o L2 y la dosis más alta cuando estén en estado L3 o L4 o cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
	Minador serpentina de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>), Gusano del cuerno (<i>Manduca quinquemaculata</i>), Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp) Trips (<i>Frankliniella</i> spp)		1.0 a 1.5		
Melón (21)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> spp), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>), Diabrotica (<i>Diabrotica</i> spp), Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp)		1.0 a 1.5	Inicie las aplicaciones cuando las larvas se encuentran en estado L1 o L2 y la dosis más alta cuando estén en estado L3 o L4 o cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
Ornamentales (SL)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)		125 ml/ en100 Litros	Inicie las aplicaciones cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
Papa (21)	Pulgón (<i>Mysus persicae</i>), Palomilla de la papa, (<i>Phthorimaea operculella</i>), Catarinita de la papa (<i>Leptinotarsa undecemlineata</i>) , Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> spp), Chicharrita (<i>Empoasca</i> sp), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)		1.0 a 1.5	Use el producto en la etapa inicial del cultivo (los primeros 30 a 40 días después de emergencia) con umbrales de infestación de 1 a 2 insectos por planta. Use la dosis baja en condiciones de baja infestación (menos de 2 insectos/planta) y la dosis más alta con infestaciones superiores, si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
Pepino (21)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>), Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp), Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp)		1.0 a 1.5	Inicie las aplicaciones cuando se detecten los primero individuos de la plaga (juveniles o adultos) y si es necesario repita con intervalos de 7 a 10 días. Realice un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	
() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. (SL) Intervalo de seguridad Sin Límite.					
Tiempo de reentrada: 48 horas después de aplicación del producto.					
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.		PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 500 mL Envase de 1 L Garrafa de 10 L		RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00	